

Shranjujte pri temperaturi $\leq 30^{\circ}\text{C}$ (86°F).



Hranite zaščiteno pred sončno svetlobo in vročino.



Samo za enkratno uporabo.
Ne uporabljajte ponovno.



Ne vsebuje naravnega lateksa.




Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana ali odprta.

PolyMem® SILVER

Navodila za uporabo

- REF 1401 - #1 obloga za prst, s srebrom**
- REF 1402 - #2 obloga za prst, s srebrom**
- REF 1403 - #3 obloga za prst, s srebrom**
- REF 1404 - #4 obloga za prst, s srebrom**
- REF 1405 - #5 obloga za prst, s srebrom**



Shranjujte pri temperaturi $\leq 30^{\circ}\text{C}$ (86°F).



Hranite zaščiteno pred sončno svetlobo in vročino.



Samo za enkratno uporabo.
Ne uporabljajte ponovno.



Ne vsebuje naravnega lateksa.



Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana ali odprta.

PolyMem® SILVER

Navodila za uporabo

- REF 1401 - #1 obloga za prst, s srebrom**
- REF 1402 - #2 obloga za prst, s srebrom**
- REF 1403 - #3 obloga za prst, s srebrom**
- REF 1404 - #4 obloga za prst, s srebrom**
- REF 1405 - #5 obloga za prst, s srebrom**



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



FMC-5886 REV.2 0922



FERRIS MFG. CORP.
5133 Northeast Parkway
Fort Worth, TX 76106-1822 U.S.A.
Toll Free U.S.A.: 800-765-9636
International: +1 817-900-1301, v Sloveniji: 01 542 5111
www.polymem.com • info@polymem.com
© 2017, 2021 Ferris Mfg. Corp. ® ali ™ označujeta blagovno znamko



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



FMC-5886 REV.2 0922

Obloga za prste na rokah/nogah PolyMem® Silver

Obloga v obliku, ki se prilega prstu.

Ne preohlapno



Ne pretresno



Ravno prav




Izbira velikosti:

Uporabite sliko na zunanjosti strani škatle ali folije, da izberete pravilno velikost oblage (1, 2, 3, 4 ali 5).

Namestitev: Obloga je zasnovana za preprosto namestitev na prst.



1. Oblogo namestite poleg prsta, tako da je vložek na koncu prsta. Po potrebi odrezite odprt konec, ne uvlihnjenega konca z vložkom, na želeno dolžino.



2. Vložek odstranite iz uvlihnjenega konca in ga zavrzite.



3. V uvlihnjeni koncu oblage vstavite prst.



4. Prst potisnite v oblogo in jo začnete odvihovati.



5. Obloga odvihnite na prst.



6. Obloga mora biti gladka in ne pretresna ali preohlapna

Mreža in besedilo naj bosta na zunanjosti strani oblage.

Obloga se mora prilegati, a udobno. Če vam je pretresna, oblogo odstranite in uporabite večjo. Odstranite jo z zavijovanjem in nasprotno stran od namestive. Oblogo lahko namestite na različne načine. Za nožne prste lahko oblogo zarezete ob straneh in naredite jezičke, ki jih namestite na spodnjo in zgornjo stran stopala. Pritrinite jih lahko s trakom ali pa oblogo zarezete tako, da oblikujete ožji ali širši obroček, ki ustreza poškodovanemu mestu na prstu.

OPIS:

Polimerna membrana oblage PolyMem je izdelana iz poliuretanske osnove, ki dobro vpija vlago in vsebuje (1) varno sredstvo za čiščenje rane, (2) vlažilno sredstvo glicerin in (3) supervpojna sredstva. Obloga je na zunanjosti strani prevlečena s tankim poliuretanskim filmom, ki diha in rano ščiti pred kontaminacijo. Obloga se lahko uporablja kot primarne, sekundarne ali kombinirane primarne in sekundarne oblage.

Izdelki PolyMem Silver vsebujejo izjemno zelo drobne delce srebra in ne bodo obavarili kože. Srebro deluje znotraj oblage in ščiti pred mikrobeno kontaminacijo. Približna vsebnost srebra na površino oblage v $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ je za PolyMem Silver 124.

Oblage PolyMem brez dodatka zdravilnih učinkov pomagajo pri:

- učinkoviti oskrbi in celjenju ran,
- vpijanju izločka in vzdrževanju vlažnega okolja za celjenje rane,
- zmanjševanju in lažjanju trdovratne bolečine in bolečine zaradi oskrbe rane,
- zmanjševanju oteklin, podplut in omejevanju širjenja vnetja v nepoškodovanem okolnem tkivu.



Obloga za prste na rokah/nogah PolyMem® Silver

Obloga v obliku, ki se prilega prstu.

Ne preohlapno



Ne pretresno



Ravno prav



Izbira velikosti:

Uporabite sliko na zunanjosti strani škatle ali folije, da izberete pravilno velikost oblage (1, 2, 3, 4 ali 5).

Namestitev: Obloga je zasnovana za preprosto namestitev na prst.



1. Oblogo namestite poleg prsta, tako da je vložek na koncu prsta. Po potrebi odrezite odprt konec, ne uvlihnjenega konca z vložkom, na želeno dolžino.



2. Vložek odstranite iz uvlihnjenega konca in ga zavrzite.



3. V uvlihnjeni koncu oblage vstavite prst.



4. Prst potisnite v oblogo in jo začnete odvihovati.



5. Obloga odvihnite na prst.



Mreža in besedilo naj bosta na zunanjosti strani oblage.

Obloga se mora prilegati, a udobno. Če vam je pretresna, oblogo odstranite in uporabite večjo. Odstranite jo z zavijovanjem in nasprotno stran od namestive. Oblogo lahko namestite na različne načine. Za nožne prste lahko oblogo zarezete ob straneh in naredite jezičke, ki jih namestite na spodnjo in zgornjo stran stopala. Pritrinite jih lahko s trakom ali pa oblogo zarezete tako, da oblikujete ožji ali širši obroček, ki ustreza poškodovanemu mestu na prstu.

OPIS:

Polimerna membrana oblage PolyMem je izdelana iz poliuretanske osnove, ki dobro vpija vlago in vsebuje (1) varno sredstvo za čiščenje rane, (2) vlažilno sredstvo glicerin in (3) supervpojna sredstva. Obloga je na zunanjosti strani prevlečena s tankim poliuretanskim filmom, ki diha in rano ščiti pred kontaminacijo. Obloga se lahko uporablja kot primarne, sekundarne ali kombinirane primarne in sekundarne oblage.

Izdelki PolyMem Silver vsebujejo izjemno zelo drobne delce srebra in ne bodo obavarili kože. Srebro deluje znotraj oblage in ščiti pred mikrobeno kontaminacijo. Približna vsebnost srebra na površino oblage v $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ je za PolyMem Silver 124.

Oblage PolyMem brez dodatka zdravilnih učinkov pomagajo pri:

- učinkoviti oskrbi in celjenju ran,
- vpijanju izločka in vzdrževanju vlažnega okolja za celjenje rane,
- zmanjševanju in lažjanju trdovratne bolečine in bolečine zaradi oskrbe rane,
- zmanjševanju oteklin, podplut in omejevanju širjenja vnetja v nepoškodovanem okolnem tkivu.

INDIKACIJE ZA UPORABO PRI LJUDEH:

Pod nadzorom zdravstvenega delavca, za oskrbo zahtevnejših ran, kot je večina ran, ki segajo skozi delno ali vso debelino kože, vključujuč:

- razjede zaradi pritiska (stopnje I-IV)
- akutne rane
- raztrganine kože
- opeklne 1. in 2. stopnje
- golenje razjede
- diabetične razjede
- kirurške rane
- razjede zaradi venske staze
- odvzemna in prejemna mesta pri presaditvah
- dermatološke bolezni
- razjede žilne etiologije

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Samo za zunanjou uporabou.
- Obloge PolyMem niso združljive z oksidirajočimi snovmi (vodikov peroksid ali raztopine hipoklorita).
- Pred postopki medicinskega slikanja preverite, ali je treba oblogo odstraniti.
- Izognite se stiku z elektrodami ali prevodnimi geli.
- Med uporabo obloge PolyMem se ne priporoča lokalnega zdravljenja.
- Bodite pozorni na znake okužbe ali maceracije.
- Ne uporabljajte oziroma prenehajte z uporabo obloge pri ljudeh, ki kažejo znake preobčutljivosti, draženja ali alergije na oblogo ali materiale v oblogi.
- Namenjena je za uporabo pri eni osebi. Ni za ponovno uporabo. Ponovna uporaba lahko poslabša njene lastnosti, širi kontaminacijo in poveča tveganje za okužbo.

Obloge PolyMem so primerne za uporabo ob prisotnih znakih okužbe, če je že uvedeno ustrezno zdravljenje vzroka okužbe.

Obloge PolyMem Silver je priporočeno uporabiti, ko je prisotno zakasnelo celjenje rane, znaki okužbe ali povečana mikrobnna obremenitev; ali ko so pri bolniku prisotni dejavniki tveganja okužbe (npr. kontaminirana rana, slaba prehranjenost, diabetes, okužbe v anamnezi itd.).

Hranite pri sobni temperaturi $\leq 30^{\circ}\text{C}$ (86°F).

Dovoljena so odstopanja $\leq 55^{\circ}\text{C}$ (131°F), vendar jih je treba čim bolj omejiti.

Zavržite po uporabi, kot je običajno za biološko nevaren odpadek.

Navedene mere so približne.

NAVODILA:**Prva namestitev obloge:**

1. Poškodovani predel pripravite skladno s protokolom ali navodili zdravnika, ki odredi zdravljenje. S kože očistite umazanijo, lokalno nanešena zdravila in losjone. Ostanek vlage na koži je koristen.
2. Oblogo namestite, kot je narisano. Obloga PolyMem mora pokriti tudi morebitno vneto ali poškodovan območje okoli poškodbe. Obloge lahko priežete glede na velikost poškodbe ali del telesa.
3. Oblogo namestite z zaščitnim filmom navzven (tako, da je viden potisk).

Koristni namigi:

- Oblogo pritrde z vodooodpornim trakom, da zmanjšate možnost kontaminacije notranjosti oblage.
- Na zunanjou stran oblage zarišite obris rane za pomoč pri odločitvi, kdaj zamenjati oblogo

Uporaba:

1. V prvih dneh boste lahko opazili močno povečano količino izločka. To ni neobičajno in pomeni, da obloga deluje.
2. Med kopanjem in nego rok naj obloga ostane suha in na svojem mestu. Če se obloga zmoči, jo zamenjajte.

Menjava oblage:

1. Pri rani z izločanjem bo izloček viden skozi zgornji sloj oblage. Obloga zamenjajte, preden izloček doseže rob rane oziroma skladno s smernicami dobre prakse oziroma najpozneje po sedmih dneh. Oblogo zamenjajte takoj, če izloček doseže rob membranske blazinice.
2. Pogosteje menjave bodo morda potrebne v primeru oslabljenega imunskega sistema, sladkorne bolezni, okužbe, hipergranulacije, maceracije tkiva ali če želite pospešiti odstranjevanje odmrlega tkiva.
3. Nežno odstranite oblogo. Blazinica PolyMem se običajno ne sprime z dnem rane, zato je menjavanje oblage običajno neboleče. Preglejte oblogo in rano, da se prepričate, da ste iz rane odstranili ves material.
4. Če se je obloga zaradi strjene krvi ali posušenega izločka sprijela s kožo ali dlakami, uporabite majhno količino fiziološke raztopine ali vode, da jo počasi ter nežno zmehčate in odstranite. Očistite nepoškodovano kožo okoli rane.
5. Oblogo menjajte skladno s protokolom ali navodili zdravnika, ki odredi zdravljenje. V večini primerov ob menjavi oblage PolyMem ni treba posegati v rano oziroma je čistiti, razen v primeru okužbe ali kontaminacije. Obloga PolyMem je zasnovana tako, da čisti rano ves čas uporabe in v njej ne pušča ostankov, ki bi jih bilo treba odstraniti.

Prekomerno čiščenje lahko poškoduje tkivo, ki se regenerira, in zakasni celjenje rane.

6. Namestite novo oblogo.

Opoznavanje med uporabo ali menjavo:

- Če celjenje poteka normalno, bo rana morda ob prvih nekaj menjavah oblage videti večja, saj telo naravno odstranjuje odmrlo tkivo. Če se po tem obdobju rana še vedno veča, se posvetujte s strokovnjakom.
- Obloge PolyMem spodbujajo tvorbo novih krvnih žil, zato ni neobičajno, če med menjavo oblage opazite krvavo obarvan izloček iz rane in v oblogi.
- Bodite pozorni na znake in simptome, kot so močnejša rdečina, vnetje, bolečina, topota, neprijeten vonj, pobelitev kože, krhkost, prekomerna rast tkiva ali zastoj v celjenju. V primeru težav, kot so okužba, draženje, občutljivost, alergije, maceracija ali hipergranulacija, se posvetujte s strokovnjakom.

O vseh resnih zapletih v povezavi s tem pripomočkom mora uporabnik in/ali bolnik poročati družbi Ferris Mfg. Corp. in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik sedež.

INDIKACIJE ZA UPORABO PRI LJUDEH:

Pod nadzorom zdravstvenega delavca, za oskrbo zahtevnejših ran, kot je večina ran, ki segajo skozi delno ali vso debelino kože, vključujuč:

- razjede zaradi pritiska (stopnje I-IV)
- akutne rane
- raztrganine kože
- opeklne 1. in 2. stopnje
- golenje razjede
- diabetične razjede
- kirurške rane
- razjede zaradi venske staze
- odvzemna in prejemna mesta pri presaditvah
- dermatološke bolezni
- razjede žilne etiologije

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Samo za zunanjou uporabou.
- Obloge PolyMem niso združljive z oksidirajočimi snovmi (vodikov peroksid ali raztopine hipoklorita).
- Pred postopki medicinskega slikanja preverite, ali je treba oblogo odstraniti.
- Izognite se stiku z elektrodami ali prevodnimi geli.
- Med uporabo obloge PolyMem se ne priporoča lokalnega zdravljenja.
- Bodite pozorni na znake okužbe ali maceracije.
- Ne uporabljajte oziroma prenehajte z uporabo obloge pri ljudeh, ki kažejo znake preobčutljivosti, draženja ali alergije na oblogo ali materiale v oblogi.
- Namenjena je za uporabo pri eni osebi. Ni za ponovno uporabo. Ponovna uporaba lahko poslabša njene lastnosti, širi kontaminacijo in poveča tveganje za okužbo.
- Obloge PolyMem so primerne za uporabo ob prisotnih znakih okužbe, če je že uvedeno ustrezno zdravljenje vzroka okužbe.

Obloge PolyMem Silver je priporočeno uporabiti, ko je prisotno zakasnelo celjenje rane, znaki okužbe ali povečana mikrobnna obremenitev; ali ko so pri bolniku prisotni dejavniki tveganja okužbe (npr. kontaminirana rana, slaba prehranjenost, diabetes, okužbe v anamnezi itd.).

Hranite pri sobni temperaturi $\leq 30^{\circ}\text{C}$ (86°F).

Dovoljena so odstopanja $\leq 55^{\circ}\text{C}$ (131°F), vendar jih je treba čim bolj omejiti.

Zavržite po uporabi, kot je običajno za biološko nevaren odpadek.

Navedene mere so približne.

NAVODILA:**Prva namestitev obloge:**

1. Poškodovani predel pripravite skladno s protokolom ali navodili zdravnika, ki odredi zdravljenje. S kože očistite umazanijo, lokalno nanešena zdravila in losjone. Ostanek vlage na koži je koristen.
2. Oblogo namestite, kot je narisano. Obloga PolyMem mora pokriti tudi morebitno vneto ali poškodovan območje okoli poškodbe. Obloge lahko priežete glede na velikost poškodbe ali del telesa.
3. Oblogo namestite z zaščitnim filmom navzven (tako, da je viden potisk).

Koristni namigi:

- Oblogo pritrde z vodooodpornim trakom, da zmanjšate možnost kontaminacije notranjosti oblage.
- Na zunanjou stran oblage zarišite obris rane za pomoč pri odločitvi, kdaj zamenjati oblogo

Uporaba:

1. V prvih dneh boste lahko opazili močno povečano količino izločka. To ni neobičajno in pomeni, da obloga deluje.
2. Med kopanjem in nego rok naj obloga ostane suha in na svojem mestu. Če se obloga zmoči, jo zamenjajte.

Menjava oblage:

1. Pri rani z izločanjem bo izloček viden skozi zgornji sloj oblage. Obloga zamenjajte, preden izloček doseže rob rane oziroma skladno s smernicami dobre prakse oziroma najpozneje po sedmih dneh. Oblogo zamenjajte takoj, če izloček doseže rob membranske blazinice.
2. Pogosteje menjave bodo morda potrebne v primeru oslabljenega imunskega sistema, sladkorne bolezni, okužbe, hipergranulacije, maceracije tkiva ali če želite pospešiti odstranjevanje odmrlega tkiva.
3. Nežno odstranite oblogo. Blazinica PolyMem se običajno ne sprime z dnem rane, zato je menjavanje oblage običajno neboleče. Preglejte oblogo in rano, da se prepričate, da ste iz rane odstranili ves material.
4. Če se je obloga zaradi strjene krvi ali posušenega izločka sprijela s kožo ali dlakami, uporabite majhno količino fiziološke raztopine ali vode, da jo počasi ter nežno zmehčate in odstranite. Očistite nepoškodovano kožo okoli rane.
5. Oblogo menjajte skladno s protokolom ali navodili zdravnika, ki odredi zdravljenje. V večini primerov ob menjavi oblage PolyMem ni treba posegati v rano oziroma je čistiti, razen v primeru okužbe ali kontaminacije. Obloga PolyMem je zasnovana tako, da čisti rano ves čas uporabe in v njej ne pušča ostankov, ki bi jih bilo treba odstraniti.
6. Namestite novo oblogo.

Opoznavanje med uporabo ali menjavo:

- Če celjenje poteka normalno, bo rana morda ob prvih nekaj menjavah oblage videti večja, saj telo naravno odstranjuje odmrlo tkivo. Če se po tem obdobju rana še vedno veča, se posvetujte s strokovnjakom.

- Obloge PolyMem spodbujajo tvorbo novih krvnih žil, zato ni neobičajno, če med menjavo oblage opazite krvavo obarvan izloček iz rane in v oblogi.

- Bodite pozorni na znake in simptome, kot so močnejša rdečina, vnetje, bolečina, topota, neprijeten vonj, pobelitev kože, krhkost, prekomerna rast tkiva ali zastoj v celjenju.

- V primeru težav, kot so okužba, draženje, občutljivost, alergije, maceracija ali hipergranulacija, se posvetujte s strokovnjakom.

O vseh resnih zapletih v povezavi s tem pripomočkom mora uporabnik in/ali bolnik poročati družbi Ferris Mfg. Corp. in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik sedež.